



existentes na sua composição (alfa e beta pirenos), produzindo dilatação local e aliviando a dor nas estruturas profundas.

A cânfora possui ação irritante cutânea, revulsiva, útil nos processos dolorosos de estruturas profundas, como: fibrosite, mialgia e lumbago. Produz, ainda, anestesia local.

O mentol (álcool terpênico obtido da essência de várias espécies do gênero *Mentha* e também por síntese), quando aplicado localmente causa uma sensação de frio por estímulo de receptores específicos, provocando, em seguida, anestesia discreta.

INDICAÇÕES

No tratamento local de manifestações reumáticas (lumbago, artrite, bursite), além de dores musculares, nevralgias, torcicolos e contusões.

CONTRAINDICAÇÕES

O MASSAGEOL É CONTRAINDICADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS, PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA OU COM HISTÓRIA ANTERIOR DE CONVULSÕES. TAMBÉM É CONTRAINDICADA A APLICAÇÃO NAS MUCOSAS, DERMATOSES, VARIZES E FERIMENTOS.

PRECAUÇÕES

O uso do produto é exclusivamente tópico e sobre pele íntegra, não devendo ser aplicado em pele com lesões. Deve ser usado com cautela em crianças, pois o salicilato de metila é considerado um veneno pediátrico em pequenas doses orais.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS/ALTERAÇÕES EM EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS

Não existem relatos até o momento.

REAÇÕES ADVERSAS

Embora com incidência baixa, foram relatadas a ocorrência de dermatite de contato, erupções cutâneas e urticária.

POSOLOGIA

Aplicar pequena quantidade do produto na região afetada, acompanhado de massagem prolongada e cobertura oclusiva com um pano de flanela ou lã, 1 a 2 vezes ao dia.

SUPERDOSE

Apesar do nível de absorção sistêmica ser baixo, medidas de suporte devem ser tomadas a critério médico. Em caso de ingestão acidental de grande quantidade do produto, podem ocorrer convulsões (em pacientes predispostos). Nestes casos, deve-se efetuar lavagem gástrica.

PACIENTES IDOSOS

O uso em pacientes idosos (acima de 60 anos) requer prescrição e acompanhamento médico.

Registro M.S. nº 1.0465.0009

Farm. Resp.: Dr. Marco Aurélio Limirio G. Filho - CRF-GO nº 3.524

Nº do lote, data de fabricação e prazo de validade: **VIDE CARTUCHO**

Prezado Cliente:

Você acaba de receber um produto **Neo Química**.

Em caso de alguma dúvida quanto ao produto, lote, data de fabricação, ligue para nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor.



Laboratório Neo Química Com. e Ind. Ltda.

VPR 1 - Quadra 2-A - Módulo 4 - DAIA - Anápolis - GO - CEP 75132-020

www.neoquimica.com.br

C.N.P.J.: 29.785.870/0001-03 - Indústria Brasileira

Faber
Print
714 - 00102
3007121 - 02/2010

Massageol®

cânfora
essência de terebintina
mentol
salicilato de metila

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Pomada: Bisnagas com 15 g ou 30 g.



USO ADULTO E PEDIÁTRICO (CRIANÇAS ACIMA DE 2 ANOS)

USO TÓPICO

COMPOSIÇÕES

Cada grama da pomada contém:

cânfora.....	0,04g
essência de terebintina.....	0,05mL
mentol.....	0,02g
salicilato de metila.....	0,04mL
excipientes q.s.p.....	1g
(parafina branca, petrolato líquido, petrolato branco e álcool etílico).	

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- O Massageol possui ação revulsiva, rubefaciente, analgésica e anestésica a nível local, promovendo pronto alívio dos fenômenos dolorosos.
- Conservar na embalagem original, em temperatura ambiente (15° a 30° C). Proteger da luz e umidade.
- Prazo de validade: **VIDE CARTUCHO**. Não use medicamento com o prazo de validade vencido; poderá ocorrer diminuição significativa do seu efeito terapêutico.
- "Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término". "Informe seu médico se está amamentando".
- "Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento".
- "Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico".
- "Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Raramente, podem ocorrer dermatite de contato, erupções cutâneas e urticária".
- "Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica".
- **"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS"**.
- O uso de Massageol é contraindicado para crianças menores de 2 anos e para pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula.
- Não aplique Massageol sobre ferimentos, dermatoses, varizes ou nas mucosas nasal, oral e ocular (sua ingestão oral pode causar envenenamento, principalmente em crianças).
- "Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando antes do início ou durante o tratamento".
- **"NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE"**.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Os revulsivos aplicados sobre a pele possuem ação irritante local, que tem por consequência a produção de efeitos indiretos de dois tipos: uma ação à distância sobre estruturas profundas e uma estimulação reflexa dos centros bulbares. A aplicação de um revulsivo na pele é seguida de rubefação e hiperemia, com um rápido alívio da dor nas estruturas subjacentes (muito provavelmente pela vasodilatação causada e o consequente aumento da circulação).

O salicilato de metila é um revulsivo orgânico volátil que age produzindo irritação local, com efeitos indiretos de atividade à distância sobre estruturas somáticas, como: músculos, serosas, articulações e vísceras, além da estimulação reflexa dos centros bulbares. Provoca analgesia e hiperemia nas regiões cutâneas em que é aplicado, quando inervadas pelo mesmo segmento do Sistema Nervoso Central (SNC). A ação da essência de terebintina deve-se ao seu efeito rubefaciente, decorrente dos inúmeros terpenos

